



POLTIGLIA BORDOLESE

Anticrittogamico rameico poltiglia bordolese in polvere bagnabile

Registrazione Ministeriale:

Bordosep - PFnPE Reg. n. 10233

Formulazione:

Polvere bagnabile

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Rame metallo puro (sotto forma di solfato neutralizzato con calce idrata) 20.0000 g

Caratteristiche:

La POLTIGLIA BORDOLESE è un fungicida rameico polivalente indicato nella lotta alle principali crittogame che attaccano le colture sotto riportate.

Modalità d'impiego:

POMACEE:

Melo, Cotogno: contro Ticchialatura (*Venturia inaequalis*) e Cancro dei rametti (*Nectria galligena*): trattamenti invernali 1,2-1,3 kg/hl, trattamenti primaverili (fase di gemma rigonfia) 0,6-0,7 kg/hl.

Pero: contro Ticchialatura (*Venturia pirina*): trattamenti invernali 1,2-1,3 kg/hl, trattamenti primaverili (fase di gemma rigonfia) 0,6-0,7 kg/hl; Fumaggine (*Cladosporium*, *Alternaria*, *Capnodium*, ecc.): primavera-estate 0,25-0,3 kg/hl; Ruggine (*Roestelia cancellata*): primavera-estate 0,25-0,3 kg/hl; Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*): primavera-estate 0,25-0,3 kg/hl; Cancro dei rametti (*Nectria galligena*): trattamenti invernali 1,2-1,3 kg/hl, trattamenti primaverili (fase di gemma rigonfia) 0,6-0,7 kg/hl; Marciume del colletto (*Phytophthora cactorum*): all'apertura delle gemme 0,6-0,7 kg/hl applicando 10-15 litri di

soluzione alla base di ogni pianta. Dose massima di impiego: 2,6 kg/ha. Sospendere i trattamenti ad inizio fioritura.

DRUPACEE:

Albicocco, Susino, Ciliegio, Pesco, Nettare, Mandorlo: contro Bolla (*Taphrina deformans*), Monilia (*M. fructigena*, *laxa*), Fumaggine (*Cladosporium*, *Alternaria*, *Capnodium*, ecc.), Corineo (*Stigmia carphophila*), Cladosporiosi (*Cladosporium carpophilum*), Cancro dei rametti (*Fusicoccum amigdaly*), Batteriosi (*Pseudomonas mors-prunorum*): autunno-inverno o comunque prima dell'apertura delle gemme 1,2-1,3 kg/hl. Limitare i trattamenti al periodo invernale.

AGRUMI:

Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Cedro, Pompelmo: contro Mal secco (*Phoma tracheiphila*), Antracnosi (*Colletotrichum gloeosporoides*), Allupatura (*Phytophthora citrophthora*, *parasitica*, *syringae*), Fumaggine (*Cladosporium*, *Alternaria*, *Capnodium*, ecc.): dalla fase pre-invaiaitura/invaiaitura alla fase di frutto maturo-riposo 0,7-0,8 kg/hl. Nel caso di piogge persistenti, ripetere il trattamento per fronteggiare reinfestazioni di Antracnosi.

ORTAGGI:

Cavoli (cavolfiori, cavolo di Bruxelles, broccoli): contro *Peronospora* (*Peronospora brassicae*), *Alternaria* (*Alternaria brassicae*): applicare dopo il trapianto o dopo l'emergenza, nelle coltivazioni seminate ad intervalli regolari a seconda dell'andamento climatico 0,5-0,6 kg/hl.

Carciofo, insalate, cardo: contro *Peronospora* (*Bremia Lactucae*) e *Alternaria* (*A. porri* var. *chicorii*): trattare al manifestarsi delle condizioni di infezione ripetendo gli interventi a seconda del decorso pluviometrico e termico 0,5-0,6 kg/hl.

Sedano, finocchio: contro *Septoriosi* (*Septoria apiicola*), *Peronospora* (*Plasmopara nivea*), *Cercospora* (*Cercospora apii*): trattare a seconda dell'andamento stagionale 0,5-0,6 kg/hl.

Melone, cocomero: contro *Peronospora* (*Pseudoperonospora cubensis*) e Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*): trattare a cadenza fissa a seconda dell'andamento climatico 0,5-0,6 kg/hl. Dose massima di impiego: 1,2 kg s.a./ha.

Pomodoro: contro *Peronospora* (*Phytophthora infestans*), *Alternaria* (*A. solanii*), *Septoria* (*Septoria lycopersici*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Botrite (*Botrytis cinerea*), Maculatura batterica (*Xanthomonas vesicatoria*), Macchiettatura batterica (*Pseudomonas tomato*), Cancro batterico (*Corynebacterium Michiganense*): trattare ad intervalli variabili a seconda del decorso stagionale e comunque dal post-trapianto fino alla fioritura 0,6-0,7 kg/hl.

Melanzana: contro *Peronospora* (*Phytophthora* spp.), *Alternaria* (*A. porri* var. *solanii*): trattare a cadenza fissa (15 giorni) a seconda dell'andamento climatico 0,5-0,6 kg/hl.

Fagiolo, pisello: contro *Peronospora* (*Peronospora pisi*), Antracnosi (*Colletotrichum lindemuthianum*), Ruggine (*Uromyces appendiculatus*): trattare a seconda del decorso meteorologico 0,5-0,6 kg/hl; Batteriosi (*Pseudomonas phaseolicola*, *Xanthomonas phaseoli*): trattamenti ripetuti 0,5-0,6 kg/hl. Carota: contro *Alternaria* (*Alternaria dauci*): trattare al verificarsi delle condizioni di sviluppo della malattia 0,5-0,6 kg/hl. Dose massima di impiego: 1,2 kg s.a./ha. Aglio, cipolla: contro *Peronospora* (*Peronospora Schleideni*), *Alternaria* (*Alternaria porri*): trattare dal momento delle condizioni di infezione a cadenza di 15 giorni 0,5-0,6 kg/hl. Data l'elevata presenza di cere sulle foglie, si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Dose massima di impiego: 1,2 kg s.a./ha

PATATA: contro *Peronospora* (*Phytophthora infestans*), *Alternaria* (*Alternaria solani*): trattare dalla fioritura fino a verso la raccolta 0,5-0,6 kg/hl. Dose massima di impiego: 1,2 kg s.a./ha

FRAGOLA: contro *Vaiolatura* (*Mycosphaerella fragariae*): trattare in pre-fioritura e durante la vegetazione autunnale 0,7-0,8 kg/hl; *Peronospora* (*Phytophthora cactorum*): trattare a seconda dell'andamento stagionale 0,7-0,8 kg/hl; Antracnosi (*Colletotrichum* spp.): trattare in pre-fioritura 0,7-0,8 kg/hl; Botrite (*Sclerotinia fuckeliana*): trattare in pre-fioritura/fruttificazione 0,7-0,8 kg/hl; Maculatura angolare (*Xanthomonas fragariae*): trattare in pre-fioritura 0,7-0,8 kg/hl; *Alternaria* (*Alternaria* spp.): trattare fino alla fioritura 0,7-0,8 kg/hl.

VITE: contro *Peronospora* (*Plasmopara viticola*) Muffa grigia (*Botrytis cinerea*): trattamenti post-floreali, fino alla chiusura del grappolo 1 kg/hl.

OLIVO: contro Occhio di Pavone (*Cycloconium oleaginum*): trattare nelle fasi di pre-fioritura e drupa ingrossata 0,7-0,8 kg/hl; Rogna (*Pseudomonas savastanoi*): trattamenti nel periodo di riposo 0,7-0,8 kg/hl; Lebbra (*Gloeosporium olivarum*): trattamenti nella fase di drupa ingrossata 0,7-0,8 kg/hl.

TABACCO: contro *Peronospora* (*Peronospora tabacina*) e *Alternaria* (*A. tenuis* o *A. tabacina*): trattare ad intervalli variabili, a seconda dell'andamento climatico sia in semenzaio che in post-trapianto 0,6-0,7 kg/hl.

FLOREALI: Ciclamino: contro Antracnosi (*Colletotrichum* spp.) e Maculatura fogliare; Filodendro: contro Batteriosi (*Erwinia* spp.); Rosa: contro Ticchiolatura (*Diplocarpon rosae*), *Peronospora* (*Peronospora sparsa*), Ruggine (*Phragmidium*), Fumaggine (*Cladosporium*, *Alternaria*, *Capnodium*, ecc.): trattare preventivamente e tempestivamente alla comparsa dei primi sintomi delle infezioni crittogamiche 0,6-0,7 kg/hl.

FORESTALI: Cipresso: contro Cancro dei rametti (*Coryneum cardinale*) e Fumaggine (*Cladosporium*, *Alternaria*, *Capnodium*, ecc.): intervenire in primavera e successivamente nel periodo autunnale 0,8-1 kg/hl.

Intervallo di sicurezza:

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Avvertenze:

COMPATIBILITÀ: il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ: non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine, susino e sulle sotto indicate varietà di melo e di pero cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tal caso se ne sconsiglia l'uso dopo la piena ripresa vegetativa. Melo: Abbondanza Belford, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King Davis, Renetta del Canada, Rosa Mantovana. Pero: Abete Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clargeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.

Unità di vendita:

Busta 500 g

Note:

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.