Revisión: 2026

Ficha tecnica

RATACUM PASTA 5 Kg - De uso profesional

"Defensa contra los roedores"

Rodenticidas



RATACUM PASTA 5 Kg - De uso profesional

Codice prodotto: 2538359P

Categoría: Biocida

Cebo rodenticida listo para usar en forma de pasta fresca DE USO PROFESIONAL TIPOS DE USUARIOS: PROFESIONALES SUPERFICIES DE USO: ESPACIOS INTERIORES y EN LOS ALREDEDORES DE LOS EDIFICIOS

Registro del Ministerio de Salud italiano::

IT/2012/00063/AUT

Características:

RATACUM PASTA FRESCA es un cebo rodenticida, listo para usar, a base de Difenacoum, una sustancia activa anticoagulante, que resulta efectiva contra el ratón común o doméstico (Mus musculus), la rata de alcantarilla (Rattus norvegicus) y la rata negra (Rattus rattus), incluso después de una única ingesta. La formulación consiste en una pasta fresca apetitosa para las especies de roedores indicadas. El producto no alarma ni suscita sospechas entre los otros miembros de la población de roedores. RATACUM PASTA FRESCA contiene una sustancia amarga, idónea para prevenir la ingestión accidental por parte de los niños. RATACUM PASTA FRESCA se puede usar en el interior y alrededor de edificios industriales (incluidos los almacenes, los depósitos y las bodegas de los barcos), rurales, no industriales, viviendas, sótanos, garajes, trasteros, jardines y espacios exteriores pertinentes.

Modalidad de uso:

DOSIS Y FORMAS DE USO
Uso en el interior de edificios para controlar al ratón doméstico (Mus musculus).
Coloque 40 g de RATACUM PASTA FRESCA en cada portacebos, que equivalen a 2 cebos de pasta fresca listos para usar, de 20 gramos cada uno, o bien a 4 cebos de pasta fresca listos para usar, de 10 gramos cada uno.
Donde sea necesario usar más portacebos, colóquelos a una distancia de aproximadamente 5-10 metros entre sí y siempre a una distancia no inferior a 5 metros.
Los portacebos se deberían inspeccionar cada 2 o 3 días al comienzo del tratamiento y, luego, como mínimo, una vez por semana. Hágalo para verificar en qué estado están los portacebos, el consumo de cebo y, de ser preciso, para extraer los restos de los roedores. De ser necesario, añada más cebo.
Siga todas las demás instrucciones que establecen las buenas prácticas pertinentes.
Uso en el interior de edificios para controlar a la rata de alcantarilla (Rattus norvegicus) y la rata negra (Rattus rattus).
Ponga 60-100 g de RATACUM PASTA FRESCA en cada portacebos, que equivalen a 3-5 cebos de pasta fresca listos para

usar, de 20 gramos cada uno, o bien a 6-10 cebos de pasta fresca, listos para usar, de 10 g cada uno.
Donde sea necesario usar más portacebos, colóquelos a una distancia de aproximadamente 5-10 metros entre sí y siempre a una distancia no inferior a 5 metros.
Los portacebos deberían inspeccionarse cada 5-7 días al comienzo del tratamiento y, luego, como mínimo, una vez por semana. Hágalo para verificar en qué estado están los portacebos, el consumo de cebo y, de ser preciso, para extraer los restos de los roedores. De ser necesario, añada más cebo.
Siga todas las demás instrucciones que establecen las buenas prácticas pertinentes.
Uso al aire libre, alrededor de los edificios: para controlar ratón común o doméstico (Mus musculus).
Coloque 40 g de RATACUM PASTA FRESCA en cada portacebos, que equivalen a 2 cebos de pasta fresca, listos para usar, de 20 gramos cada uno, o bien a 4 cebos de pasta fresca, listos para usar, de 10 gramos cada uno.
Donde sea necesario usar más portacebos, posiciónelos a una distancia de aproximadamente 5-10 metros entre sí y siempre a una distancia no inferior a 5 metros.
Proteja el cebo de los fenómenos atmosféricos (por ejemplo: lluvia, nieve, etc.). Posicione los portacebos llenos en zonas que no se inunden.
Los portacebos llenos deberían controlarse como mínimo cada 2-3 días al comienzo del tratamiento y, como mínimo, una vez por semana a continuación, a fin de constatar si el cebo gusta, si los portacebos están en buenas condiciones y para extraer los restos de los roedores. Vuelva a llenar el portacebos cuando sea necesario.
No aplique este producto directamente en las madrigueras.
Cambie los cebos de los portacebos menoscabados por el agua o sucios.
Siga todas las demás instrucciones que establecen las buenas prácticas pertinentes.
Uso al aire libre, alrededor de los edificios para controlar a la rata de alcantarillas (Rattus norvegicus) y la rata negra (Rattus rattus).
Ponga 60-100 g de RATACUM PASTA FRESCA en cada portacebos, que equivalen a 3-5 cebos de pasta fresca listos para usar, de 20 gramos cada uno, o bien a 6-10 cebos de pasta fresca, listos para usar, de 10 g cada uno.
Donde sea necesario usar más portacebos, colóquelos a una distancia de aproximadamente 5-10 metros entre sí y siempre a una distancia no inferior a 5 metros.
Proteja el cebo de los fenómenos atmosféricos (por ejemplo: lluvia, nieve, etc.). Posicione los portacebos llenos en zonas que no se inunden.
Los portacebos llenos deberían controlarse como mínimo cada 5-7 días al comienzo del tratamiento y, como mínimo, una vez por semana a continuación, a fin de constatar si el cebo gusta, si los portacebos están en buenas condiciones y para extraer los restos de los roedores. Vuelva a llenar el portacebos cuando sea necesario.
No aplique este producto directamente en las madrigueras.
Cambie los cebos de los portacebos menoscabados por el agua o sucios.
Siga todas las demás instrucciones que establecen las buenas prácticas pertinentes.

Revisión: 2026

Ficha tecnica

RATACUM PASTA 5 Kg - De uso profesional

"Defensa contra los roedores"

Rodenticidas

Tipos de uso:

Profesional

Advertencias:

Antes de usar el producto, lea y siga al pie de la letra las instrucciones que se aprecian en el envase, así como la ficha adjunta o los datos que le faciliten en el punto de venta. Antes de posicionar los cebos, inspeccione la zona infestada e identifique in situ las especies de roedores y los espacios en que actúan. Determine las causas probables y la magnitud de la infestación.
Saque del lugar las fuentes de alimentos que puedan alcanzar fácilmente los roedores (por ejemplo: granos de cereales desparramados por el piso o trozos de alimentos).
Además, no limpie la zona infestada inmediatamente antes del tratamiento, dado que ello molesta sólo a la población de los roedores y hace que resulte más difícil que acepten el cebo.
Use el producto exclusivamente en el marco del sistema de Manejo Integrado de Plagas (MIP), que, entre otras cosas, incluye medidas de higiene. Donde sea posible, use métodos físicos de control.
Baraje la posibilidad de tomar medidas preventivas de control (por ejemplo: cegar las cuevas y eliminar todas las fuentes de alimentos y agua, de ser viable) para verificar la cantidad de producto consumida y disminuir las posibilidades de reinfestación. Los portacebos llenos se ubicarán muy cerca de los lugares donde haya constatado anteriormente la actividad de los roedores (por ejemplo: senderos, nidos, corrales de ganado, cuevas, madrigueras, etc.).
Cuando resulte viable, ancle los portacebos contra el piso o contra otras estructuras.
Los portacebos deben llevar etiquetas claras que indiquen que contienen rodenticidas y que no hay que extraerlos ni abrirlos.
Cuando el producto se use en lugares públicos, hay que señalizar los espacios tratados mientras dure el tratamiento. Junto a los cebos, hay que colocar un aviso que indique el riesgo de envenenamiento primario y secundario vinculado al anticoagulante y las medidas de primeros auxilios a aplicar en caso de envenenamiento.
Hay que sujetar el cebo de manera tal que no puedan sacarlo del portacebos.
Posicione el producto fuera del alcance de los niños, pájaros, animales domésticos, animales de corral y otros animales no diana.
Posicione el producto lejos de la comida, bebidas y piensos para animales, así como de herramientas o superficies que pueden entrar en contacto con el producto.
Al manipular el producto, use guantes de protección resistentes a las sustancias químicas.
Mientras esté usando el producto, no coma, ni beba, ni fume. Lávese las manos y la epidermis expuesta directamente después de usar el producto.
Las visitas a la zona tratada se realizarán con la frecuencia que el profesional considere oportuna, según los controles realizados al principio del tratamiento. Dicha frecuencia tiene que ser acorde a las recomendaciones que figuran en el código de buenas prácticas correspondiente.
Si consumen poco cebo en comparación con la magnitud evidente de la infestación, analice la conveniencia de ubicar los puntos cebo en otros sitios y si es posible cambiar el tipo de formulación del cebo.
Si, al cabo de 35 días de tratamiento, los roedores siguen consumiendo los cebos pero no se aprecia que disminuya su actividad, es necesario que determine la causa más probable. Si ya ha descartado otros factores, es probable que haya roedores resistentes: por tanto, estudie si conviene usar un rodenticida no-anticoagulante o un rodenticida anticoagulante más efectivo, si están disponibles. Además, baraje usar trampas como medida alternativa de control.
Al final del periodo de tratamiento, saque del lugar los cebos restantes o los portacebos llenos. No abra las bolsitas que contienen cebo.
El producto es peligroso para la fauna silvestre.

Paquetes de venta:

cubo 5 kg

Nota:

Use todo biocida con cautela. Antes de usar el producto, lea siempre la etiqueta y la información sobre el mismo.
Preste suma atención a las frases y símbolos de peligro que se aprecian en la etiqueta.
El texto que figura en la ficha corresponde a la etiqueta que aprobó el Ministerio de Sanidad.