



## FENDONA® PRO 60sc

**Codice prodotto: 1538050A**

**Categoria: Biocida**

Insetticida in sospensione concentrata

### Registrazione Ministeriale:

n. IT/2019/00603/MRP

### Formulazione:

Liquido Concentrato

### Composizione:

**100 grammi di prodotto contengono:**

Alfa-cipermetrina pura: 5,83g

1,2-Propylene glycol: 14,00g

### Caratteristiche:

FENDONA® PRO è un insetticida liquido in sospensione concentrata, solo per uso professionale (professionisti formati), da impiegare in crepe e fessure e/o in applicazioni puntiformi. È efficace nei confronti di insetti volanti e striscianti quali blattella germanica (*Blattella germanica*), formiche (*Lasius niger*), zanzare comuni (*Culex* spp.), vespe (*Vespa* spp.), cimici dei letti (*Cimex lectularius*) e mosche (*Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*).

### Modalità d'impiego:

FENDONA® PRO viene applicato utilizzando qualsiasi spruzzatore convenzionale manuale o elettrico regolato per produrre un'irrorazione grossolana a bassa pressione. Il volume appropriato del prodotto viene aggiunto al volume richiesto di acqua pulita e agitato. Se si verifica un ritardo tra i trattamenti, è necessaria una nuova agitazione prima del riutilizzo.

Per blattella germanica, formiche e cimici dei letti, il prodotto dovrebbe essere applicato su tutta l'area infestata come spray ad irrorazione grossolana a crepe e fessure e / o su punti bersaglio o in aree in cui gli insetti possono strisciare e nascondersi.

Per gli insetti volanti, il prodotto deve essere applicato in tutta l'area infestata come spray ad irrorazione grossolana su punti o aree mirati in cui gli insetti possono depositarsi.

**DOSI D'IMPIEGO E FREQUENZA D'APPLICAZIONE**

Impiegare FENDONA® PRO seguendo le indicazioni riportate nella tabella sottostante:

Quantità di prodotto (mL)	Volume d'acqua per diluizione (L)	Superficie trattata (m2)
25	5	100
12.5	2.5	50
5	1	20
2.5	0.5	10
1.25	0.25	5

Per trattare una superficie di 20 m<sup>2</sup>, ad esempio, è necessario diluire 5 ml di prodotto in 1 litro d'acqua. La durata residua del deposito varia a seconda della pulizia e della natura della superficie su cui viene applicato e della misura in cui il residuo rimane indisturbato. Il prodotto presenta un'attività residua prolungata, laddove i residui rimangono indisturbati: fino a 1 mese contro le formiche (*Lasius niger*) e fino a 3 mesi contro le cimici dei letti (*Cimex lectularius*) e le mosche (*Musca domestica*). L'attività contro le blatte (*Blattella germanica*) si ottiene solo con depositi freschi. L'attività contro le zanzare (*Culex spp.*) si ottiene solo con depositi freschi su superfici non porose (non su superfici porose). L'attività residua contro le vespe (*Vespula spp.*) si ottiene solo su superfici non porose (non su superfici porose) fino ad un periodo di 3 mesi.

#### ISTRUZIONI SPECIFICHE PER L'USO

Leggere l'etichetta prima dell'uso. Usare FENDONA® PRO esclusivamente all'interno di grandi edifici, locali industriali e commerciali.

Dopo aver stimato la superficie da trattare, preparare la soluzione spray aggiungendo il volume appropriato di FENDONA® PRO al volume richiesto di acqua pulita e agitare.

Il volume appropriato di prodotto viene misurato utilizzando il contenitore del prodotto di erogazione "Bettix" o un dispositivo di dosaggio standard, secondo la tabella sopra descritta (vedasi il paragrafo "Dosi d'impiego e frequenza di applicazione").

Quando è vuoto, sciacquare tre volte il contenitore e utilizzare la soluzione di risciacquo per preparare la soluzione spray per l'applicazione.

Applicare utilizzando qualsiasi spruzzatore convenzionale manuale o elettrico regolato per produrre un'irrorazione grossolana a bassa pressione. Se si verifica un ritardo tra i trattamenti, agitare nuovamente prima del riutilizzo.

Dopo l'applicazione, gli insetti che sono entrati in contatto con il deposito dovrebbero mostrare segni di abbattimento entro 30 – 60 minuti, con un notevole impatto sul numero della popolazione totale entro pochi giorni.

La mortalità delle blatte (*Blattella germanica*) viene raggiunta 1 settimana dopo l'esposizione degli insetti alle superfici trattate.

Si prevede un notevole effetto "knockdown" (abbattimento) sulle cimici dei letti entro 24 ore dal contatto con le superfici trattate e la mortalità è raggiunta 1 settimana dopo l'esposizione.

La mortalità delle zanzare (*Culex spp.*) viene raggiunta in 2-4 giorni dopo l'esposizione degli insetti alle superfici trattate.

Si prevede un notevole effetto "knockdown" (abbattimento) sulle mosche entro 6 ore dopo il contatto degli insetti con le superfici non porose trattate e la mortalità si raggiunge in 24-72 ore; sulle vespe entro 6 ore dopo il contatto degli insetti con le superfici non porose trattate e la mortalità si raggiunge in 24 ore.

Le aree trattate devono essere nuovamente ispezionate dopo 2-3 settimane. Laddove l'infestazione iniziale fosse stata grave o si osservasse una nuova infestazione, potrebbe essere necessaria una seconda applicazione, in particolare se il primo trattamento è stato disturbato o alcuni rifugi / siti di atterraggio sono stati saltati nell'applicazione iniziale.

Per il controllo delle cimici dei letti è necessaria almeno 1 ri-applicazione.

Lasciare asciugare la soluzione applicata prima di permettere ad esseri umani e/o animali di rientrare nelle aree trattate.

#### Intervallo di sicurezza:

Frequenza: 1 – 2 applicazioni per anno.

#### Avvertenze:

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.  
DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.

IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE E AGLI ANIMALI.

#### Confezioni di vendita:

Flacone 500ml

#### Informazioni per lo smaltimento:

**COPYR® È UN BRAND RISPETTOSO DELL'AMBIENTE**

Compone Materiale			Informazioni aggiuntive
Flacone	Plastica	HDPE 2	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verificare
Tappo	Plastica	PP 05	L'imballaggio contiene un insetticida, prima di procedere con la raccolta differenziata, verificare

#### NOTE AGGIUNTIVE

Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta

#### CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

##### Note:

Titolare: BASF Agro S.p.A ® Marchio registrato BASF Agro.

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.