

GEL SCARAFAGGI FORTE 25g

"Difesa degli ambienti"

Insetticidi Pronti all'uso



GEL SCARAFAGGI FORTE 25g

Codice prodotto: 1538317

Categoria: Biocida

Esca insetticida in gel pronta all'uso da applicare in gocce - uso per professionisti formati

Registrazione Ministeriale:

IT/2017/00441/MRP

Formulazione:

Gel

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3): 2.15g

Bitrex® (denatonio benzoato): 0,008g

Caratteristiche:

GEL SCARAFAGGI FORTE è un insetticida in formulazione gel da utilizzare in interni, efficace contro le specie adulte di Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana. MODALITÀ D'IMPIEGO Applicazione d'esca in gel applicata come gocce da una siringa. Applicare il biocida solo in crepe e fessure, dietro mobili e macchine.

Modalità d'impiego:

Applicazione d'esca in gel applicata come gocce da una siringa. Applicare il biocida solo in crepe e fessure, dietro mobili e macchine. ISTRUZIONI PER L'USO Leggere sempre l'etichetta prima di utilizzare il prodotto e rispettare tutte le istruzioni fornite. Esegui un'ispezione prima di applicare il prodotto per vedere il livello di infestazione e le aree interessate. Utilizzare solo in ambienti chiusi. Il prodotto non può essere utilizzato su superfici. Non mescolare con altri prodotti chimici o in aree trattate di recente con un altro insetticida. Non applicare su legno o superfici porose. Evitare il contatto con le superfici trattate. DOSE Una goccia corrisponde a 0.04 g di prodotto. Attenersi ai dosaggi indicati di seguito: Blatta fuochista (Blattella germanica) 0.12-0.16 g/m² (3-4 gocce/m²); Scarafaggio nero (Blatta orientalis) 0.16-0.24 g/m² (4-6 gocce/m²); Blatta rossa (Periplaneta americana) 0.16-0.24 g/m² (4-6 gocce/m²). Frequenza di applicazione Il prodotto va applicato una volta ogni 4 settimane. Se l'infestazione persiste, riapplicare il prodotto non più di una volta. Frequenza del trattamento Il trattamento può

essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente.

Avvertenze:

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO Per evitare fenomeni di resistenza, è consigliabile alternare trattamenti con prodotti basati su principi attivi con meccanismo d'azione differente. L'esca non deve essere posta in prossimità di alimenti, mangimi o bevande. Il prodotto va utilizzato solo fino a completo controllo dell'infestazione. Usare il prodotto alle dosi e agli intervalli raccomandati. Per un trattamento efficace, rispettare le buone pratiche di igiene. Rimuovere o impedire l'accesso ad eventuali fonti di cibo alternative; le esche dovranno rappresentare la più importante fonte di alimento disponibile per le blatte. Per una elevata efficacia, controllare l'esca una volta a settimana e riposizionarla se danneggiata o consumata. Il prodotto deve essere maneggiato in modo sicuro al fine di minimizzare il rischio di assunzione da parte di bambini o animali non bersaglio. Non gettare il prodotto a terra, in corsi d'acqua, nel lavandino o in scarichi fognari. Applicare solo in zone nascoste e lontano dall'acqua. Non disperdere nell'ambiente. Utilizzare in aree nascoste di difficile accesso e lontano dall'acqua. Al termine della campagna di trattamento, raccogliere le trappole per lo smaltimento. Smaltire il prodotto non utilizzato, la sua confezione e tutti gli altri residui (insetti morti) in conformità con le normative locali.

MISURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO Indossare guanti adatti durante l'applicazione. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Il prodotto non deve essere applicato in aree accessibili ai bambini. Limitare il trattamento alle aree in cui l'animale è a portata di mano. Non applicare su superfici o utensili che potrebbero essere a contatto con alimenti/mangimi. Il prodotto verrà applicato nell'industria alimentare in assenza di prodotti alimentari, salvo nei magazzini dove i prodotti stoccati sono tenuti adeguatamente imballati. Devono essere adottate misure adeguate per garantire che alimenti, attrezzature o eventuali utensili manipolati in luoghi precedentemente trattati con il prodotto non contengano residui della sostanza attiva. Utilizzare in aree nascoste di difficile illuminazione e lontano dall'acqua. Adottare metodi di controllo integrato dei parassiti, come la combinazione di metodi di controllo chimico e fisico e altre misure di sanità pubblica, tenendo conto delle specificità locali (condizioni climatiche, specie bersaglio, condizioni d'uso, ecc.). Verificare l'efficacia del prodotto in loco: se necessario, identificare la causa della ridotta efficacia per assicurarsi che non vi sia resistenza o per identificare potenziali resistenze. Non utilizzare il prodotto in aree in cui si sospetta o si verifica resistenza. Informare il titolare dell'autorizzazione se il trattamento è inefficace.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Non dimenticare di rimuovere le lenti a contatto. In caso di contatto con la pelle, lavare con sapone e abbondante acqua, senza strofinare. Se necessario, portare la vittima in ospedale e mostrare l'etichetta del prodotto o il contenitore, quando possibile. Non lasciare sola la persona intossicata. Informazioni per il medico: Trattamento sintomatico e di supporto.

IN CASO DI ASSISTENZA MEDICA, TENERE A PORTATA DI MANO IL CONTENITORE O L'ETICHETTA E CONTATTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

MISURE DI PROTEZIONE AMBIENTALE Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente (acque superficiali, di falda, fognature, scarichi, ecc.) mediante la costruzione di barriere protettive, chiudendo gli scarichi. In caso di sversamento, contattare le autorità competenti. Il prodotto fuoriuscito deve essere assorbito con materiale inerte (sabbia, caolino), raccolto in appositi contenitori ed identificato come rifiuto pericoloso.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO SICURO DEL PRODOTTO E DEL SUO IMBALLAGGIO Il prodotto è stabile, all'interno del contenitore originale, fino a 4 anni se conservato in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole. È raccomandabile conservare il prodotto a temperature comprese tra 5°C e 45°C.

AVVERTENZE Il fabbricante garantisce la formula e il contenuto. Il rischio di eventuali danni derivanti da eventi esterni al controllo del fabbricante, nonché da immagazzinamento o da applicazione incorretti o impropri del prodotto, ricade comunque sull'utente.

Confezioni di vendita:

Siringa 25g

Informazioni per lo smaltimento:

Ricicliamo insieme

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Astuccio Busta	Carta Plastica	PAP 21 PET/EVOH/PE 7	Raccolta differenziata Raccolta differenziata

NOTE AGGIUNTIVE

L'imballaggio vuoto può essere conferito in raccolta differenziata, l'imballaggio contenente i residui di combustione va trattato come rifiuto speciale. Svuota bene l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

GEL SCARAFAGGI FORTE 25g***"Difesa degli ambienti"*****Insetticidi Pronti all'uso**

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.