




## GENERATION BLOCK

**Codice prodotto: 2538408**

**Categoria: Biocida**

Esca rodenticida in blocchi pronta all'uso PER NON PROFESSIONISTI

**Registrazione Ministeriale:**

IT/2013/00119/MRA

**Formulazione:**

Blocco Paraffinato

**Composizione:**

**100 grammi di prodotto contengono:**

Difetialone (N°CAS 104653-34-1 ): 0,0025g  
: g

**Caratteristiche:**

GENERATION BLOCK è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, nota come Difetialone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione. GENERATION BLOCK contiene una sostanza amaricante (Denatonium Benzoate) atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e un colorante. GENERATION BLOCK può essere usato all'interno (topi e ratti) ed intorno (ratti) di edifici industriali, rurali, civili, depositi merci, abitazioni, cantine, garage, ripostigli. A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci.

**Modalità d'impiego:**

- TOPI: fino a 50 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 1-1.5 metri l'uno dall'altro (all'interno degli edifici).
- RATTI: fino a 200 g di esca per contenitore. Se fossero necessari più contenitori per esche, posizionarli ad una distanza minima di 4-5 metri l'uno dall'altro (all'interno degli edifici/intorno agli edifici).

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni (per topi 2-3 giorni) (per ratti 5-7 giorni) all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario

**Tipologia di utilizzo:**

Domestico

**Avvertenze:**

Smaltire i roditori morti secondo la normativa vigente. Non utilizzare i rodenticidi anticoagulanti come esche permanenti (ad esempio per prevenire eventuali infestazioni o per monitorare attività dei roditori). L'utilizzo di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. Le informazioni relative al prodotto devono chiaramente suggerire che in caso di sospetta inefficacia al termine del trattamento (ad esempio si osserva ancora attività di roditori), l'utilizzatore dovrebbe chiedere suggerimenti al fornitore di prodotto o chiamare un Servizio di disinfestazione. Verificare la presenza di roditori morti e rimuoverli durante il trattamento, almeno con la stessa frequenza di visita dei contenitori per esche. I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze. Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente.

**Confezioni di vendita:**

Busta da 300g (contenente esche in blocco da 10g ciascuna)

**Informazioni per lo smaltimento:**

| Riciclamo insieme |           |            |                         |
|-------------------|-----------|------------|-------------------------|
| Componente        | Materiale |            | Informazioni aggiuntive |
| Busta             | Plastica  | Plastica 7 | Raccolta differenziata  |

**NOTE AGGIUNTIVE**

Il prodotto contiene un rodenticida, prima di procedere con la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune

**CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE**

**Note:**

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta. Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.