RODITAN GRANO

Codice prodotto: 2538285

Categoria: Biocida

Esca topicida-ratticida a base di Bromadiolone, pronta all'uso in grano. Per uso Non professionale all'interno ed intorno agli edifici.

Registrazione Ministeriale:

IT/2018/00376/AUT

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Denatonio Benzoato: 0.0010g
Bromadiolone: 0.0027g

Caratteristiche:

RODITAN è un'esca pronta all'uso a base di Bromadiolone e formulata in grano, efficace per il controllo di Topolino domestico (Mus musculus), Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus), appetibile soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. L'ingestione di una quantità sufficiente di esca causa la morte di ogni roditore nel volgere di qualche giorno, senza creare allarme o destare sospetto negli altri componenti della colonia. Questo è possibile in virtù del meccanismo di azione degli anticoagulanti, che provocano emorragie interne letali. Grazie alla sua appetibilità, RODITAN può essere impiegato con successo per derattizzazioni all'interno ed intorno ad abitazioni, cantine, garage e ripostigli. ORGANISMI TARGET - Topolino domestico (Mus musculus) • Ratto grigio (Rattus norvegicus) • Ratto nero (Rattus rattus)

Modalità d'impiego:

Uso all'interno di edifici per il controllo del Topolino Domestico (Mus musculus). I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio
del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei
roditori. Quando necessario reintegrare l'esca. Uso all'interno di edifici per il controllo di Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus). I contenitori
dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare

l'integrità dei contenitori, il consumo
dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca. Uso intorno agli edifici per il controllo di Ratto grigio (Rattus
norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus). Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc.). Posizionare i contenitori con l'esca in zone non
soggette ad allagamenti. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito,
al fine di controllare se l 'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario. Sostituire
le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate da sporcizia.
DOSI DI APPLICAZIONE – Topolino Domestico (Mus musculus): 50-60 g x 10 mq. Ratto grigio (Rattus norvegicus) e Ratto nero (Rattus rattus). 80-150 g x 10 mq.
INDICAZIONI PER L'USO – Prima di utilizzare il prodotto, seguire attentamente le indicazioni in etichetta o fornite presso il punto vendita. Prima di utilizzare un rodenticida, è opportuno considerare metodi di controllo non chimici alternativi (es. trappole). Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione. Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata prima del trattamento, dal momento che potrebbe disturbare la popolazione di roditori e rendere più difficile che questi accettino le esche. Il prodotto va posizionato all'interno di un appropriato contenitore per esche a prova di manomissione, protetto dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.
Sul contenitore ci deve essere la scritta "Non toccare" e l'avvertenza riguardo al contenuto ("contiene un rodenticida"). Le stazioni per le esche vanno posizionate vicino ai luoghi dove sono stati visti i roditori (es. nei pressi delle tane, lungo le loro piste, buchi, ecc.). Quando possibile, le stazioni vanno fissate al terreno o su altre strutture.

Revisione: 2026

Scheda Tecnica

RODITAN GRANO

"Difesa dai roditori"

Rodenticidi

Tipologia di utilizzo:

Domestico

Avvertenze:

Non aprire i sacchettini predosati contenenti l'esca. Posizionare le stazioni fuori dalla portata di bambini, volatili, animali da compagnia ed altri animali non bersaglio.
Le stazioni vanno inoltre posizionate lontano da cibi, bevande, alimenti per animali o utensili che possano venire in contatto con questi. Non posizionare le stazioni vicino a scarichi, in cui il prodotto possa venire in contatto con acqua. Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio. Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Al termine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori con le esche. Pericoloso per la fauna selvatica.

Confezioni di vendita:

ASTUCCIO 150 g

Note:

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.