

BROMUS PASTA FRESCA 5kg

Codice prodotto: 2450615A

Categoria: Biocida

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di pasta fresca. USO PROFESSIONALE CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI Area di utilizzo interno ed intorno agli edifici

Registrazione Ministeriale:

IT/2014/00194/AUT

Formulazione:

Pasta

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Brodifacoum (CAS: 56073-10-0): 0,005g
Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6): 0,001g

Caratteristiche:

CARATTERISTICHE TECNICHE BROMUS PASTA FRESCA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. BROMUS PASTA FRESCA contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. BROMUS PASTA FRESCA può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.
ORGANISMI TARGET Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti e ratto nero (*Rattus rattus*) sia giovani che adulti.
MODALITÀ APPLICATIVE BROMUS PASTA FRESCA è un'esca pronta all'uso in forma di pasta fresca, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

Thinking Forward

Copyr

Revisione: 2026

Scheda Tecnica

BROMUS PASTA FRESCA 5kg

"Difesa dai roditori"

Rodenticidi

Modalità d'impiego:

BROMUS PASTA FRESCA è un’esca pronta all’uso in forma di pasta fresca, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall’ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell’ambiente.
DOSI E MODI IMPIEGO
Uso all’interno di edifici Per il controllo del Topolino Do-mestico (Mus musculus).
Posizionare 40 g di BROMUS PASTA FRESCA per conteni-tore, pari a 2 esche in pasta fresca pronti all’uso da 20 grammi ciascuno.
Laddove dovessero essere necessari più contenitori posi-zionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l’uno dall’altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all’inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l’integrità dei contenitori, il consumo dell’esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l’esca. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone prati-che pertinenti.
Uso all’interno di edifici Per il controllo del Ratto grigio (Rattus norvegicus) e ratto nero (Rattus rattus).
Posizionare 60-100 g di BROMUS PASTA FRESCA per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta fresca pronti all’uso da 20 grammi ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posi-zionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l’uno dall’altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all’inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l’integrità dei contenitori, il consumo dell’esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l’esca. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone prati-che pertinenti. Uso all’esterno, intorno agli edifici Per il controllo del To-polino Domestico (Mus musculus).
Posizionare 40 g di BROMUS PASTA FRESCA per conteni-tore, pari a 2 esche in pasta fresca pronti all’uso da 20 grammi ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posi-zionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l’uno dall’altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. Proteggere l’esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l’esca in zone non soggette ad allagamenti. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati al-meno ogni 2-3 giorni all’inizio del trattamento e almeno set-timanalmente in seguito, al fine di controllare se l ‘esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando ne-cessario. Non applicare direttamente nelle tane. Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall’acqua o contaminate dalla sporcizia Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone prati-che pertinenti.
Uso all’esterno, intorno agli edifici Per il controllo del Ratto grigio (Rattus norvegicus) e ratto nero (Rattus rattus).
Posizionare 60-100 g di BROMUS PASTA FRESCA per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta fresca pronti all’uso da 20 grammi ciascuno. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posi-zionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l’uno dall’altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. Proteggere l’esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l’esca in zone non soggette ad allagamenti. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati al-meno ogni 5-7 giorni all’inizio del trattamento e almeno set-timanalmente in seguito, al fine di controllare se l ‘esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando ne-cessario. Non applicare direttamente nelle tane. Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall’acqua o contaminate dalla sporcizia Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone prati-che pertinenti.

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avvertenze:

Prima dell’uso leggere e seguire le istruzioni riportate sull’imballo del prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita
Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell’area infestata e ad una valutazione in loco al fine d’identificare la specie di roditori, i luoghi d’attività e determinare la probabile cause e l’entità dell’infestazione.
Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l’area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l’accettazione dell’esca. Il prodotto deve essere usato unicamente all’interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l’altro, anche misure d’igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.
Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: chiusura dei buchi, rimozione, per quanto possibile, di tutte le fonti di cibo e acqua) in modo da verificare la quantità di prodotto consumata e ridurre la possibilità di re-infestazione.
I contenitori con l’esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l’attività dei roditori è stataverificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d’entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).
Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad al-tre strutture. I contenitori per esche devono essere chiaramente

etichet-tati segnalando che contengono rodenticidi e che non devo-no essere rimossi o aperti.
Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trat-tamento.
Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.
L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascina-ta fuori dal contenitore per esche.
Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non ber-saglio.
Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono en-trare in contatto con il prodotto.
Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodot-to. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto.
La frequenza delle visite all'area trattata dovrebbe essere a discrezione dell'operatore, alla luce dell'indagine condotta all'inizio del trattamento. Tale frequenza dovrebbe essere coerente con le raccomandazioni fornite dal relativo codice di buone pratiche.
Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione e-vidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo for-mulazione d'esca.
Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminu-zione nell'attività dei roditori, è necessario determinarne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: conside-rare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più effica-ce. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alter-nativa di controllo

Revisione: 2026

Scheda Tecnica

BROMUS PASTA FRESCA 5kg

"Difesa dai roditori"

Rodenticidi

Confezioni di vendita:

Secchio 5 kg

Informazioni per lo smaltimento:

Ricicliamo insieme

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Secchio	Plastica	PP 05	L'imballaggio contiene un rodenticida, prima di procedere con la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune.
Coperchio	Plastica	PP 05	L'imballaggio contiene un rodenticida, prima di procedere con la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune.
Sacco	Plastica	LDPE 4	L'imballaggio contiene un rodenticida, prima di procedere con la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.