



STORM ULTRA

Codice prodotto: 2538821

Categoria: Biocida

Esca rodenticida in blocchi pronta all'uso per il controllo di topi e ratti all'interno e intorno agli edifici, per uso da parte di professionisti formati.

Registrazione Ministeriale:

IT/2019/00556/MRP

Formulazione:

Blocco Paraffinato

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Flocoumafen, puro: 0,0025g

Denatonium benzoato: 0,001g

Caratteristiche:

STORM® Ultra è un'esca rodenticida pronta all'uso per il controllo delle specie giovani e adulte di topo domestico (*Mus musculus*), ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e ratto nero o dei tetti (*Rattus rattus*), da impiegare negli edifici e nelle aree ad essi circostanti. STORM® Ultra è un'esca rodenticida pronta all'uso da impiegare in contenitori per esche a prova di manomissione, all'interno degli edifici e nelle aree ad essi circostanti. L'esca può anche essere impiegata utilizzando punti esca coperti e protetti, purché forniscano lo stesso livello di protezione per le specie non bersaglio e gli esseri umani date dalle stazioni per esche a prova di manomissione, o, in alternativa, intorno agli edifici, applicando l'esca pronta all'uso direttamente nelle tane e nei cunicoli. STORM® Ultra va impiegato utilizzando la tecnica "pulsed baiting": sostituire l'esca consumata solo dopo 3 giorni e poi ad intervalli di massimo 7 giorni. Raccogliere le esche rovesciate e i roditori morti. La frequenza delle visite all'area trattata dovrebbe essere a discrezione dell'operatore, alla luce dell'indagine ispettiva condotta all'inizio del trattamento. Tale frequenza dovrebbe essere coerente con le raccomandazioni fornite dal codice delle buone pratiche pertinenti.

Modalità d'impiego:

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni sul prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita.

Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca.

Il prodotto deve essere posto nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui è stata osservata l'attività dei roditori (ad esempio: sentieri, siti di nidificazione, mangiatoie, buche, cunicoli ecc.).

Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture.

Posizionare i contenitori per esca fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio.

Posizionare i contenitori per esca lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto.

Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione.

Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.

I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti.

Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.

L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche.

Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (es. EN 374).

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca.

Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione nell'attività dei roditori, è necessario determinarne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo.

Seguire le istruzioni specifiche fornite dal codice di buona pratica applicabile a livello nazionale.

Rimuovere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento.

Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

Oltre ad adottare le misure sopra riportate e relative all'uso dell'esca sia all'interno che intorno agli edifici, per il solo utilizzo esterno, attenersi anche a quanto indicato di seguito:

- i punti d'esca devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di ridurre al minimo l'esposizione alle specie non bersaglio;
- le esche devono essere posizionate per ridurre al minimo l'esposizione alle specie non bersaglio e ai bambini;
- coprire o bloccare gli ingressi di tane / cunicoli muniti di esche per ridurre i rischi di rigetto e di fuoriuscita dell'esca;
- proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti d'esca in aree non soggette ad allagamenti;
- sostituire qualsiasi esca nei vari punti d'esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.

DOSI

TOPI DOMESTICI

Utilizzare 15 – 25 g di esca per punto d'esca (uso interno ed esterno).

RATTI

All'interno degli edifici: utilizzare 50 – 75 g di esca per punto d'esca.

Per uso esterno: utilizzare 50 – 75 g di esca per tana.

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avvertenze:

DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA.
DA NON IMPIEGARE IN AGRICOLTURA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.
IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE ALLE PERSONE E AGLI ANIMALI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

Confezioni di vendita:

Secchio da 3 kg

Note:

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.
Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.